Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae
Stadionplein 46, 6225 XW Maastricht

BP

Vertrouwelijk
Bloedwaardentest
CPark Bata,Building 21,Unit
1.23
Europaplein 1
NL-5684 ZC Best

Rapport

Telefoon: Fax:

Patient	Geboortedatum Geslacht	Resultaat nummer
B[redacted]B.	[redacted]09 V	[redacted]

Materiaal: **serum, serum**

Monster afname: Materiaal ontvangst: 29.03.23 10:02

Methode		Resultaat		Referentie waarde	
INFECTIE-DIAGNOSTIEK					
cytomegalie virus IgG	CLIA	↑↑ **116**	U/ml	< 12	
cytomegalie virus IgM	CLIA	8	U/ml	< 22	
Het analyseresultaat duidt op een langer geleden doorgemaakte CMV-infectie, resp. een passieve immunisering. Bij verdacht op een reactivering evtl. het virus direct aantonen d.m.v. de PCR-techniek. (EDTA)					
Epstein Barr virus-(VCA)-IgG		<10	U/ml	< 20	
EBV nucl. ag. (EBNA) IgG	CLIA	<3	U/ml	< 5	
Serologisch geen indikatie voor een EBV-infektie. Een akute infektie kan door de bepaling van EBV-IgM uitgesloten worden.					
hepatitis A-(IgG/IgM)	ECLIA	negatief		negatief	
hepatitis A-IgM	ECLIA	negatief		negatief	
Geen aanwijzing voor een acute of doorlopen hepatitis A virusinfectie. Eventueel vaccinatie overwegen.					
HBsAg	ECLIA	negatief		negatief	
anti-HBc	ECLIA	negatief		negatief	
hepatitis C al.	ECLIA	negatief		negatief	
Hepatitis C-Antilichamen zijn ca. 2 maanden post infektie aantoonbaar. Een hepatitis C-infectie kan echter in een eerder stadium d.m.v. een HCV-PCR-test (antigeentest) worden aangetoond. Geschikt materiaal hiervoor is EDTA-bloed.					
hepatitis E IgG	ELISA	0.22	RE/ml	negatief < 0.80 grenswaardig 0.80 - 1.10 positief > 1.10	
hepatitis E IgM	ELISA	0.08	Ratio	negatief < 0.80 grenswaardig 0.80 - 1.10 positief > 1.10	

MEDISCHE LABORATORIA
DR. STEIN & COLLEGAE

Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae
Stadionplein 46, 6225 XW Maastricht

BP

Vertrouwelijk
Bloedwaardentest
CPark Bata,Building 21,Unit
1.23
Europaplein 1
NL-5684 ZC Best

Rapport

Telefoon: Fax:

Patient	Geboortedatum Geslacht	Resultaat nummer
B[redacted]B.	[redacted]09 V	[redacted]

Methode		Resultaat		Referentie waarde	
Geen aanwijziging voor een verse of vroegere hepatitis E infektie. Een seroconversie kan vaak pas na 4-9 maanden na de primaire infektie aangetoond worden. Bij verdenking op een verse infektie is de bepaling van hepatitis E virus RNA in bloed of feces aanbevolen.					
SARS-CoV-2 Ak (N-Protein)	ECLIA	↑↑ **22.80**	COI positief	< 1.0 >= 1.0	*
Deze test bepaalt antistoffen van de klasse IgG/IgA/IgM. Antilichamen tegen SARS-CoV-2 aangetoond, acute/doorgemaakte SARS-Cov-2 infectie aan te nemen. Bij verdenking op een acute infectie is een PCR (keeluitstrijkje) aan te bevelen.					
HIV 1/2 (AK/AG)	ECLIA	negatief		negatief	
HIV-1/2 duo: combitest van de 4e generatie (op HIV-1/2 antilichamen en HIV-1 p24 antigeen). Een negatieve uitslag 5 tot 12 weken na een mogelijke infectie sluit een HIV-infectie met grote zekerheid uit.					
Treponema pallidum zoektest	ECLIA	negatief		negatief	
geen indicatie voor een acute of doorlopen treponema pallidum infectie.					
strongyloides IgG*		7.0	U/ml	< 9	

Gevalideerd door Dr. Maurice Pelsers
Met vriendelijke groeten
Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae

Stadionplein 46
6225 XW Maastricht

Antwoordnummer 20122
6300 VB Valkenburg

Telefoon 043 - 36 22 225
Telefax 043 - 36 23 344

info@medlabstein.nl
www.medlabstein.nl

Artsen laboratoriumgeneeskunde: Dr. med. Dietmar Dreßen, Dr. med. Beate Roxane Jaeger, Dr. med. Hanno Kehren, Dr. med. Josef van Helden, Dr. med. Wilhelm Holle, Dr. med. Oliver Lentzen, Dr. med. Melanie Roßkothen, Dr. med. M. L. Wimmer-Dahmen, Dr. med. Mareen von Tettau, Dr. med. Inka Schüttert, Maria-Elisabeth Krömer, Priv.-Doz. Dr. med. Eray Yagmur

Artsen microbiologie: Dr. medic. A. Molnar-Mayer, Dr. med. Heime Rieber, Dr. med. K.-H. Nachtsheim, Dr. med. Jelena Cucuz, Priv.-Doz. Dr. med. W. M. Kalka-Moll, Wolfgang Büchel

Arts humane genetica: Dr. Robert Maiwald