

Vertrouwelijk  
Bloedwaardentest  
CPark Bata, Building 21, Unit  
1.23  
Europaplein 1  
NL-5684 ZC Best

Uw nummer :  
Ontvangst :  
Afname :

## Rapport

Telefoon: Fax:

Patient	Geboortedatum	Geslacht	Resultaat nummer
K. E.	.85	V	

Methode	Resultaat	Referentie waarde
Materiaal: serum, stolbloed		
Monster afname: Materiaal ontvangst: 19.05.23 10:39		
<b>INFECTIE-DIAGNOSTIEK</b>		
cytomegalie virus IgG	CLIA <5 U/ml	< 12
cytomegalie virus IgM	CLIA <5 U/ml	< 22
Serologisch geen indicatie voor een cytomegalie virus infectie.		
Epstein Barr virus-(VCA)-IgG	CLIA ↑ 74 U/ml	< 20
Epstein Barr virus-(VCA)-IgM	CLIA <10.0 U/ml	< 20
EBV nucl. ag. (EBNA) IgG	CLIA ↑↑ >600 U/ml	< 5
Het resultaat van de test wijst op een vroegere Epstein- Barr-virus infectie (mononucleose). EBNA-antistoffen zijn in de meeste gevallen zelfs na tientallen jaren nog aantoonbaar. Bij immuunsuppressie reactivering mogelijk.		
hepatitis A-(IgG/IgM)	ECLIA positief	negatief
hepatitis A-IgM	ECLIA negatief	negatief
Hepatitis A-IgG antistoffen positief! Opnieuw testen op Hepatitis A antistoffen over ca. 3 jaar.		
HBsAg	ECLIA negatief	negatief
anti-HBc	ECLIA negatief	negatief
hepatitis C al.	ECLIA negatief	negatief
Hepatitis C-Antilichamen zijn ca. 2 maanden post infectie aantoonbaar.		
Een hepatitis C-infectie kan echter in een eerder stadium d.m.v. een HCV-PCR-test (antigeentest) worden aangetoond. Geschikt materiaal hiervoor is EDTA-bloed.		
hepatitis E IgG	ELISA 0.43 RE/ml	negatief < 0.80 grenswaardig 0.80 - 1.10 positief > 1.10
hepatitis E IgM	ELISA 0.03 Ratio	negatief < 0.80 grenswaardig 0.80 - 1.10 positief > 1.10

Vertrouwelijk  
Bloedwaardentest  
CPark Bata, Building 21, Unit  
1.23  
Europaplein 1  
NL-5684 ZC Best

## Rapport

Telefoon: Fax:

Patient	Geboortedatum	Geslacht	Resultaat nummer
K. E.	85	V	

Methode	Resultaat	Referentie waarde
Geen aanwijziging voor een verse of vroegere hepatitis E infectie. Een seroconversie kan vaak pas na 4-9 maanden na de primaire infectie aangetoond worden. Bij verdenking op een verse infectie is de bepaling van hepatitis E virus RNA in bloed of feces aanbevolen.		
SARS-CoV-2 Ak (N-Protein)	ECLIA ↑↑ 5.57 COI positief	< 1.0 * ≥ 1.0
Deze test bepaalt antistoffen van de klasse IgG/IgA/IgM. Antilichamen tegen SARS-CoV-2 aangetoond, acute/doorgemaakte SARS-Cov-2 infectie aan te nemen. Bij verdenking op een acute infectie is een PCR (keeluitstrijkje) aan te bevelen.		
HIV 1/2 (AK/AG)	ECLIA negatief	negatief
HIV-1/2 duo: combitest van de 4e generatie (op HIV-1/2 antilichamen en HIV-1 p24 antigeen). Een negatieve uitslag 5 tot 12 weken na een mogelijke infectie sluit een HIV-infectie met grote zekerheid uit.		
Treponema pallidum zoektest	ECLIA negatief	negatief
geen indicatie voor een acute of doorlopen treponema pallidum infectie.		
strongyloides IgG*	6.1 U/ml	< 9

Gevalideerd door Dr. Maurice Pelsers  
Met vriendelijke groeten  
Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae