

BP

Vertrouwelijk
Bloedwaardentest
CPark Bata, Building 21, Unit
1.23
Europaplein 1
NL-5684 ZC Best

Rapport

Telefoon: Fax:

Patient	Geboortedatum	Geslacht	Resultaat nummer
BZ	02	M	

Methode Resultaat Referentie waarde

Materiaal: **serum, EDTA-bloed, stolbloed**

Monster afname: Materiaal ontvangst: 01.05.26 09:37

INFECTIE-DIAGNOSTIEK

cytomegalie virus IgG	CLIA	↑↑	>180.0	U/ml	< 12
cytomegalie virus IgM	CLIA		20	U/ml	< 22

Het analyseresultaat duidt op een langer geleden doorgemaakte CMV-infectie, resp. een passieve immunisering. Bij verdacht op een reactivering evtl. het virus direct aantonen d.m.v. de PCR-techniek. (EDTA)

Epstein Barr virus-(VCA)-IgG	CLIA		<10	U/ml	< 20
Epstein Barr virus-(VCA)-IgM	CLIA		<10.0	U/ml	< 20
EBV nucl. ag. (EBNA) IgG	CLIA		<3	U/ml	< 5

Geen indicatie voor een Epstein Barr virus infectie (mononucleose, ziekte van Pfeiffer). Bij een aanhoudende verdenking op EBV-infectie eventueel het virus direct detecteren d.m.v. de EBV-DNA PCR-Methode (EDTA-bloed!).

hepatitis A-(IgG/IgM)	ECLIA	negatief	negatief
hepatitis A-IgM	ECLIA	negatief	negatief

Geen aanwijzing voor een acute of doorlopen hepatitis A virusinfectie. Eventueel vaccinatie overwegen.

HBsAg	ECLIA	negatief	negatief
anti-HBc	ECLIA	negatief	negatief
hepatitis C al.	ECLIA	negatief	negatief

Hepatitis C-Antilichamen zijn ca. 2 maanden post infectie aantoonbaar.

Een hepatitis C-infectie kan echter in een eerder stadium d.m.v. een HCV-PCR-test (antigeentest) worden aangetoond. Geschikt materiaal hiervoor is EDTA-bloed.

hepatitis E IgG	ELISA	<0.2	RE/ml	negatief	< 0.80
				grenswaardig	0.80 - 1.10
				positief	> 1.10
hepatitis E IgM	ELISA	0.07	Ratio	negatief	< 0.80
				grenswaardig	0.80 - 1.10
				positief	> 1.10

Geen aanwijziging voor een verse of vroegere hepatitis E infectie. Een seroconversie kan vaak pas na 4-9 maanden na de primaire infectie aangetoond worden. Bij verdenking op een verse infectie is de bepaling van hepatitis E virus RNA in bloed of feces aanbevolen.

SARS-CoV-2 Ak (N-Protein)	ECLIA	↑↑	29.50	COI	< 1.0	*
				positief	>= 1.0	

Deze test bepaalt antistoffen van de klasse IgG/IgA/IgM.

Antilichamen tegen SARS-CoV-2 aangetoond, acute/doorgemaakte SARS-Cov-2 infectie aan te nemen. Bij verdenking op een acute infectie is een PCR (keeluitstrijkje) aan te bevelen.

HIV 1/2 (AK/AG)	ECLIA	negatief	negatief
-----------------	-------	----------	----------

HIV-1/2 duo: combitest van de 4e generatie (op HIV-1/2 antilichamen en HIV-1 p24 antigeen).

Een negatieve uitslag 5 tot 12 weken na een mogelijke infectie sluit een HIV-infectie met grote zekerheid uit.

Treponema pallidum zoektest	ECLIA	negatief	negatief
-----------------------------	-------	----------	----------

geen indicatie voor een acute of doorlopen treponema pallidum infectie.

strongyloides IgG/IgM*	ELISA	1.6	U/ml	< 9
------------------------	-------	-----	------	-----

Gevalideerd door Dr. Maurice Pelsers
Met vriendelijke groeten
Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae

Stadionplein 46
6225 XW Maastricht
Telefoon 043 - 36 22 225
Telefax 043 - 36 23 344

Antwoordnummer 20122
6300 VB Valkenburg
info@medlabstein.nl
www.medlabstein.nl

Artsen laboratoriumgeneeskunde: Dr. med. Dietmar Dreßen, Dr. med. Beate Roxane Jaeger, Dr. med. Hanno Kehren, Dr. med. Josef van Helden, Dr. med. Wilhelm Holle, Dr. med. Oliver Lentzen, Dr. med. Melanie Roßkothen, Dr. med. M. L. Wimmer-Dahmen, Dr. med. Mareen von Tettau, Dr. med. Inka Schütter, Maria-Elisabeth Krömer, Priv.-Doz. Dr. med. Eray Yagmur

Artsen microbiologie: Dr. medic. A. Molnar-Mayer, Dr. med. Heime Rieber, Dr. med. K.-H. Nachtsheim, Dr. med. Jelena Cucuz, Priv.-Doz. Dr. med. W. M. Kalka-Moll, Wolfgang Büchel

Arts humane genetica: Dr. Robert Maiwald