

BP

Vertrouwelijk
Bloedwaardentest
CPark Bata,Building 21,Unit
1.23
Europaplein 1
NL-5684 ZC Best

Rapport

Telefoon: Fax:

EINDRAPPORT van 15.12.25 10:30 Pagina 1/2

Patient	Geboortedatum	Geslacht	Resultaat nummer
N.B. -	.85	V	

Methode	Resultaat	Referentie waarde
---------	-----------	-------------------

Materiaal: serum, EDTA-bloed, stolbloed

Monster afname: 04.12.25 00:00 Materiaal ontvangst: 05.12.25 10:43

IqM	ITURB	1.25	q/1	0.4 - 2.3
-----	-------	------	-----	-----------

INFECTIE-DIAGNOSTIEK

cytomegalie virus IgG	CLIA	↑↑	>180.0	U/ml	< 12
cytomegalie virus IgM	CLIA		<5	U/ml	< 22

Het analyseresultaat duidt op een langer geleden doorgemaakte CMV-infectie, resp. een passieve immunisering. Bij verdacht op een reactivering evtl. het virus direct aantonen d.m.v. de PCR-techniek. (EDTA)

Epstein Barr virus-(VCA)-IgG	CLIA	↑	>750	U/ml	< 20
Epstein Barr virus-(VCA)-IgM	CLIA	↑	<10	U/ml	< 20
EBV nucl. ag. (EBNA) IgG	CLIA	↑↑	160	U/ml	< 5

Antilichamen uit de latente fase van een Epstein Barr virusinfectie (EBNA-1 al.) zijn aantoonbaar, hetgeen wijst op een doorgemaakte primaire EBV infectie. Reactiveringen kunnen niet worden uitgesloten, maar zijn serologisch moeilijk aan te tonen.

Bij patiënten met een onderdrukt immuunsysteem kan de detectie van EBV-DNA via een PCR-test (uit EDTA-bloed) zinvol zijn.

hepatitis A- (IgG/IgM)	ECLIA	positief	negatief
hepatitis A-IgM	ECLIA	negatief	negatief

Hepatitis A-IgG antistoffen positief! Opnieuw testen op Hepatitis A antistoffen over ca. 3 jaar.

HBsAg	ECLIA	negatief	negatief
anti-HBc	ECLIA	negatief	negatief
hepatitis C al.	ECLIA	negatief	negatief

Hepatitis C-Antilichamen zijn ca. 2 maanden post infectie
aantoonbaar.

Een hepatitis C-infectie kan echter in een eerder stadium d.m.v. een HCV-PCR-test (antigeentest) worden aangetoond. Geschikt materiaal hiervoor is EDTA-bloed.

Methode	Resultaat	Referentie waarde
---------	-----------	-------------------

hepatitis E IgG	ELISA	<0.2	RE/ml	negatief < 0.80
				grenswaardig 0.80 - 1.10
				positief > 1.10
hepatitis E IgM	ELISA	0.17	Ratio	negatief < 0.80
				grenswaardig 0.80 - 1.10
				positief > 1.10

Geen aanwijzing voor een verse of vroegere hepatitis E infectie. Een seroconversie kan vaak pas na 4-9 maanden na de primaire infectie aangetoond worden. Bij verdenking op een verse infectie is de bepaling van hepatitis E virus RNA in bloed of feces aanbevolen.

SARS-CoV-2 Ak (N-Protein)	ECLIA	↑↑↑	112.00	COI	< 1.0	*
				positief	>= 1.0	

Deze test bepaalt antistoffen van de klasse IgG/IgA/IgM.
Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-2, akute/durchgemachte SARS-CoV-2- Infektion anzunehmen. Bei V.a. akute Infektion Direktnachweis empfohlen (PCR aus Rachenabstrich).
Hinweis: Der durchgeführte Roche-Test auf Antikörper gegen das Nucleocapsid-Antigen von SARS-CoV-2 ist nicht geeignet zur Beurteilung der Immunantwort nach einer (ggf. zusätzlich erfolgten) Impfung mit den aktuell verfügbaren Impfstoffen.

HIV 1/2 (AK/AG)	ECLIA	negatief	negatief
-----------------	-------	----------	----------

HIV-1/2 duo: combitest van de 4e generatie (op HIV-1/2 antilichamen en HIV-1 p24 antigeen).
Een negatieve uitslag 5 tot 12 weken na een mogelijke infectie sluit een HIV-infectie met grote zekerheid uit.

Treponema pallidum zoektest	ECLIA	negatief	negatief
-----------------------------	-------	----------	----------

treponema pallidum ziektest ECLIA negatief
geen indicatie voor een acute of doorlopen treponema pallidum infectie.

strongyloides IgG/IgM*	ELISA	2.0	U/ml	< 9
------------------------	-------	-----	------	-----

Gevalideerd door Dr. Maurice Pelsers
Met vriendelijke groeten
Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae

Stadionplein 46
6225 XW Maastricht

Telefoon 043 - 36 22 225
Telefax 043 - 36 23 344

Antwoordnummer 20122
6300 VB Valkenburg

info@medlabstein.nl
www.medlabstein.nl

Arten laboratoriumsgeneeskunde: Dr. med. Dietmar Dreßen, Dr. med. Beate Roxane Jaeger,
Dr. med. Hanno Kehren, Dr. med. Josef van Helden, Dr. med. Wilhelm Holle, Dr. med. Oliver Lentzen,
Dr. med. Melanie Roßkothen, Dr. med. M. L. Wimmer-Dahmen, Dr. med. Mareen von Tettau,
Dr. med. Inka Schüttert, Maria-Elisabeth Krömer, Priv.-Doz. Dr. med. Eray Yagmur

Artsen microbiologie: Dr. medic. A. Molnar-Mayer, Dr. med. Heime Rieber, Dr. med. K.-H. Nachtsheim, Dr. med. Jelena Cucuz, Priv.-Doz. Dr. med. W. M. Kalka-Moll, Wolfgang Büchel

Arts humane genetica: Dr. Robert Maiwald